

Забывшие экспедиции

Орнитологические наблюдения в Джунгарском Алатау в 1954 г.

Материалы экспедиции М.Н. Корелова реанимированы Н.Н. Березовиковым по сохранившимся в архиве дневникам.

С 26 мая по 30 июня 1954 г. мной совершена экспедиция в северной части Джунгарского Алатау с целью изучения фауны птиц. Маршрут и сроки полевых работ следующие: Алма-Ата – Николаевка – Илийск – степь у подножия Чулака (26 мая); ущелье Кара-Чока (27/28 мая); ущелье Тюлькули до перевала на хр. Алтын-Эмель (28/29 мая); Кугалы – Царицынский перевал – р. Каратал у Талды-Кургана (30 мая); степное озерко в 25 км севернее г. Талды-Курган (31 мая/1 июня); ст. Уштобе (1 июня); 2-5 июня – оз. Сарыколь, в 25 км северо-восточнее Талды-Кургана (2-5 июня); пос. Капал (5/6 июня); северный склон хр. Мынчукур у пос. Капал (7-10 июня); альпийская зона хр. Мынчукур у цирка Музбулак (11 июня); слияние Биеней, Баян-Журек и горы Коктас (14-18 июня); 21 июня – степь Курумбель между пос. Капал и р. Биен (21 июня); 27 июня – Джайляу в окр. Капала (27 июня); болота в 7 км северо-восточнее пос. Капал (29 июня); карагачовая роща у пос. Капал (30 июня). В качестве таксидермиста в экспедиции принимал участие Э.Ф. Родионов.

Ниже приводим краткую информацию о 129 встреченных видах птиц.

Черношейная поганка (*Podiceps nigricollis*). На озерке в 25 км севернее г. Талды-Кургана 31 мая найдены плавающие гнезда, содержащие кладки по 1,2 и 3 яйца. При повторном осмотре 22 июня многие из них были затоплены в результате подъема уровня воды. На оз. Сарыколь 3-4 июня встречена гнездовая пара, из которой добыт 1 экз.

Огарь (*Tadorna ferruginea*). Гнездовая пара 26 мая наблюдалась у подножия гор Чулак на ручье у Кара-Чока. На оз. Сарыколь 3 июня держались пары и выводок из 12 особей с уже лётным молодняком. В Капальской долине наблюдалась 14 июня у слияния Биеней.

Кряква (*Anas platyrhynchos*). На озерке в 25 км севернее г. Талды-Кургана 31 мая отмечен выводок с пуховичками, из числа которых добыты самка и 2 птенца. На оз. Сарыколь 3 июня часто встречались брачные пары.

Серая утка (*Anas strepera*). Гнездится на оз. Сарыколь, где 3 июня часто встречались брачные пары.

Шилохвость (*Anas acuta*). Там же 3 июня отмечены брачные пары.

Трескунок (*Anas querquedula*). В каменистом ущелье с ручьем близ оз. Сарыколь и на самом озере 2 и 3 июня отмечались брачные пары и случаи спариваний.

Широконоска (*Anas clypeata*). На озерке в 25 км севернее Талды-Кургана и на оз. Сарыколь 31 мая и 3 июня держались брачные пары.

Красноголовая чернеть (*Aythya ferina*). На озерке в 25 км севернее г. Талды-Кургана 1 июня брачная пара.

Белоглазая чернеть (*Aythya nyroca*). На оз. Сарыколь 3 июня из стаи добыт 1 экз., а 4 июня на побережье этого озера под кучами снопов сжатого тростника найдено 3 гнезда, выстроенных из сухих стеблей тростника и высланных черным пухом. В одном содержалась кладка из 12 свежих яиц, во втором – 1 свежее яйцо, а третье было уже полностью выстроено, но еще без яиц.

Большой крохаль (*Mergus merganser*). В ущелье р. Биен в горах Коктас 13 июня отмечена самка.

Черный коршун (*Milvus migrans*). Одиночки изредка наблюдались в ущелье Кара-Чока (27 мая), у оз. Сарыколь (2 и 5 июня), на северном склоне хр. Мынчукур в районе Музбулака (8, 10, 11 июня), у слияния Биеней (18 июня) и у пос. Капал (27 июня).

Обыкновенный осоед (*Pernis apivorus*). В коллекции К.К. Клипперта на Каратальской МТС нами осмотрено чучело осоеда, добытого 6 июня 1953 г. в роше колхоза «Красный восток».

Степной лунь (*Circus macrourus*). Наблюдался в ущелье Кара-Чок (27 мая), на степном озерке в 25 км севернее г. Талды-Курган и оз. Сарыколь (1 и 4 июня).

Луговой лунь (*Circus pygargus*). В Капальской долине у слияния Биеней 14 июня отмечена пара, а на болотистых лугах в 7 км северо-восточнее пос. Капал 29 июня найдено гнездо с 2 сильно насиженными яйцами и добыто 4 экз. луней.

Камышовый лунь (*Circus aeruginosus*). Сравнительно обычен был 3-5 июня в прибрежных тростниках на оз. Сарыколь.

Тетеревятник (*Accipiter gentilis*). На северном склоне хр. Мынчукур близ Капала в верхних ущельях со скалами и ельником 7 июня добыта самка с угнетенным яичником, а 8 и 9 июня в этих местах наблюдались еще две одиночки. В коллекции К.К. Клипперта осмотрен экземпляр, добытый в середине апреля 1954 г. в районе Каратальской МТС.

Курганник (*Buteo rufinus*). На выходах скал у Кара-Чока 26 мая наблюдалась пара и обнаружено старое гнездо. На следующий день встречались в ущелье Кара-Чока.

Змеяяд (*Circaetus gallicus*). В горах Коктас по р. Биен 15 июня видели змеяяда с ящерицей в лапах. Примечательно, что при выслеживании добычи он часто становился против ветра и не взмахивая крыльями (а сжимая их как при пикировании), «стоял» в воздухе на месте.

Степной орел (*Aquila nipalensis*). На северном склоне хр. Мынчукур близ пос. Капал 8 июня видели пролетавшего орла.

Беркут (*Aquila chrysaetos*). Одиночки наблюдались на хр. Алтын-Эмель в ущелье Тюлькули (29 мая), в поясе ельников на северном склоне хр. Мынчукур близ пос. Капал (8 июня), в Музбулаке (11 июня) и над р. Биен (13 июня).

Стервятник (*Neophron percnopterus*). Встречен единственный раз в ущелье Кара-Чок (28 мая).

Черный гриф (*Aegypius monachus*). Обитает в Капальской долине, где одиночки наблюдались на северном склоне хр. Мынчукур и в Музбулаке (8 и 10 июня), в горах Коктас по р. Биен (15 июня). На джайляу в горах у Капала 27 июня наблюдали около 20 грифов. На окраине пос. Капал двух летающих грифов видели 6 июня.

Белоголовый сип (*Gyps fulvus*). В Капальской долине встречен 21 июня в степи Курымбель. Над вершинами хр. Мынчукур 7 июня парило 5 сипов, возможно, **кумаи** (*Gyps himalayensis*). Еще несколько таких же сипов видели 27 июня в скоплении грифов на джайляу в горах у Капала.

Сапсан (*Falco peregrinus*). За время поездки встречен дважды: 31 мая на р. Каратал у Талды-Кургана и 21 июня в Капальской долине у слияния Биеней. В коллекции К.К. Клипперта осмотрено чучело сапсана, добытого в середине апреля 1954 г. в районе Каратальской МТС [*Возможно птицы принадлежали к форме *babylonicus*, которая сейчас рассматривается как подвид шахина *Falco pelegrinoides*, а не сапсана, как это было принято в середине прошлого века. К сожалению Мстислав Николаевич не упоминает подвидовую принадлежность встреченных птиц. Если сапсан встреченный в середине апреля мог оказаться и задержавшимся после зимовки, то две другие встречи произошли явно в гнездовое время, когда вероятнее встретить шахина*].

Чеглок (*Falco subbuteo*). Одиночки наблюдались в степи у подножия Чулака близ Кара-Чока (26 мая), на хр. Алтын-Эмель у вершины перевала в ущелье Тюлюкули (29 мая) и на оз. Сарыколь (3 июня). Двух чеглоков встретили 6 июня в карагачовой роще у пос. Капал, а 27 июня видели одного, гонявшего воробьев на колхозной ферме. На северном склоне хр. Мынчукур и в Музбулаке 8 и 10 июня в ельниках наблюдались одиночки и пары, играющие в воздухе.

Степная пустельга (*Falco naumanni*). Сравнительно обычен по ксерофитной периферии гор Джунгарского Алатау. В ущелье Кара-Чока 27 мая в расщелине скалы осмотрено гнездо с 4 яйцами, в которых эмбрионы заполняли три четверти их объема. Второе гнездо найдено здесь же в старом гнезде курганника и содержало яйцо-«болтун» и 3 вылупившихся птенца. На дальнейшем маршруте эта пустельга часто наблюдалась вдоль дороги между Кугалы и Царицынским перевалом, в степи в окрестностях Талды-Кургана и Сарыколя. Около Уштобе пустельги гнездились в обрывчиках вместе с сизоворонками, золотистыми шурками и индийскими воробьями. В Капальской долине наблюдалась у слияния Биеней (14 июня), а 29 июня добыта в окрестностях пос. Капал.

Обыкновенная пустельга (*Falco tinnunculus*). На северном склоне хр. Мынчукур близ Капала обычна в ущельях со скальниками и ельником. В одной из скальных гряд 8 июня найдено гнездо с 7 пуховыми птенцами, устроенное в небольшой пещерке, вход в которую закрывали кусты шиповника.

Тетерев (*Lyrurus tetrix*). Обитает в ельниках на северном склоне хр. Мынчукур близ Капала, где 6 и 7 июня встречены самка и самец.

Гималайский улар (*Tetraogallus himalayensis*). На хр. Алтын-Эмель помёт уларов встречали на перевале из ущелья Тюлюкули (29 мая). На северном склоне хр. Мынчукур в Музбулаке 11 июня в скалах цирка слышали голоса, а затем видели следы 5 уларов, перешедших снежник. Ниже, у верхних елок, на восточном склоне отрога с гранитами обнаружен выводок, сопровождаемых двумя самками, от которого в коллекцию добыт птенец. После выстрела птенцы поднялись на крыло и планируя разлетелись в разные стороны.

Кеклик (*Alectoris chukar*). В скалках по ручью у Кара-Чока 27 мая добыты самец и самка, с готовым к сносу яйцом. Здесь же 26 мая в травостое у подножия скалы найдено гнездо с 7 холодными слабо насиженными яйцами, а рядом остатки самки, съеденной каким-то хищником. В Капальской долине часто встречался в горах Коктас по р. Биен (14-15 июня), где добыт самец в сильно развитыми семенниками и большим наседным

пятном. В ущелье на северном склоне хр. Мынчукур близ Капала 25 июня встречен выводок из 3 особей, из числа которых коллектирована самка с угнетенным яичником и наседным пятном.

Серая куропатка (*Perdix perdix*). У подножия хр. Мынчукур близ Капала 9 июня на водопое у ручья встречена брачная пара, из которой добыта самка с развитым наседным пятном.

Перепел (*Coturnix coturnix*). На хр. Алтын-Эмель 28 и 29 июня в ущелье Тюлькули встречена одиночка и брачная пара. Бой самцов слышали на лугах северного склона хр. Мынчукур близ Капала (8 июня), на посевах и луговом разнотравье между Капалом и Талды-Курганом (21 июня) и особенно много во время поездки в горы на джайляу в горах у Капала (27 июня). В пойме р. Биен 17 июня в травостое на лугу найдено гнездо с 10 свежими яйцами.

Серый журавль (*Grus grus*). На оз. Сарыколь 3 июня держалась стая численностью 50-60 особей.

Красавка (*Anthropoides virgo*). В долине Курымбель между Капалом и Биеном 10 июня держалась пара среди типчаково-ковыльной степи. В 7 км северо-восточнее пос. Капал 29 июня пара пролетела со стороны болота на пшеничное поле.

Пастушок (*Rallus aquaticus*). На оз. Сарыколь 3 июня слышали брачный крик самца, а на следующий день в куче скошенного тростника найдено гнездо с 4 свежими яйцами. Глубокий лоток этого гнезда был выстлан сухими стеблями и листьями тростника.

Коростель (*Crex crex*). В посещенных местах оказался исключительно редок и лишь единственный раз был встречен 29 июня на болоте в 7 км северо-восточнее пос. Капал.

Лысуха (*Fulica atra*). Оказалась обычной на степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана, где 31 мая найдено два гнезда с одним и пятью свежими яйцами. Многочисленна также на оз. Сарыколь, где 3 июня осмотрена кладка из 7 слабо насиженных яиц.

Малый зуек (*Charadrius dubius*). Встречен на ручье около ущелья Кара-Чока (26 мая), на галечниках Каратала у Талды-Кургана (30 мая) и по солончаковым берегам оз. Сарыколь (3 июня).

Чибис (*Vanellus vanellus*). На степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана 31 мая встречена взрослая птица с птенцом величиной с перепела. На оз. Сарыколь 3 и 4 июня найдено 2 гнезда с кладками по 4 сильно насиженных яйца и пойман птенец недельного возраста. В Капальской долине 13 июня добыт на болотах по р. Биен, а 27 июня взрослый коллектирован от выводка в окрестностях пос. Капал.

Кулик-сорока (*Haematopus ostralegus*). Наблюдался 30 мая на галечниковых берегах р. Каратал, а 31 мая на степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана встречено 2 пары, из числа которых в коллекцию добыто 2 экз. Еще две пары были отмечены на солончаковых берегах оз. Сарыколь.

Травник (*Tringa totanus*). Обычен на гнездовании на степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана и по солончаковым берегам оз. Сарыколь. Гнездится также на торфяном болоте в 7 км северо-восточнее пос. Капал (29 июня).

Перевозчик (*Actitis hypoleucos*). Гнездовые пары наблюдались на галечниковых берегах р. Каратал близ Талды-Кургана (30 мая) и на р. Биен у Баян-Журека (13 июня). В окрестностях пос. Капал 25 июня на речке пойман пуховой птенец.

Белохвостый песочник (*Calidris temminckii*). Небольшие стайки изредка наблюдались на степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана (31 мая) и оз. Сарыколь (3 и 5 июня).

Бекас (*Gallinago gallinago*). В Капальской долине обычен на болотах по р. Биен, где 17 июня добыта пара. Встречается также на торфяном болоте в 7 км северо-восточнее пос. Капал (29 июня).

Кроншнеп (*Numenius sp.*). На степном озере в 25 км севернее Талды-Кургана 31 мая отмечен кроншнеп, не определенный до вида.

Луговая тиркушка (*Glareola pratincola*). Многочисленной была по берегам р. Каратал и степном озере в 25 км севернее Талды-Кургана (30-31 мая). В большом числе гнездилась по солончаковым берегам оз. Сарыколь, где 2 июня найдены кладки с 1 и 3 свежими яйцами.

Озерная чайка (*Larus ridibundus*). На степном озере в 25 км севернее Талды-Кургана 31 мая на сплавине найдено гнездо с 2 насиженными яйцами. Вечером здесь также появились две стаи по 15 и 18 особей с уже летным молодняком. На оз. Сарыколь 3-4 июня чайки держались стаями с молодняком, уже поднявшимся на крыло.

Черная крачка (*Chlidonias niger*). На степном озере в 25 км севернее Талды-Кургана 31 мая на сплавинах найдена многочисленная колония. Гнезда, построенные из куги, содержали кладки по 2-3 яйца, в большинстве случаев свежие. При повторном осмотре 21 июня большинство гнезд оказалось затопленными в результате подъема уровня воды, появились повторные кладки, а в уцелевших содержались пуховые птенцы. Большие гнездовые колонии обнаружены также 3-4 июня на оз. Сарыколь.

Черноносая крачка (*Gelochelidon nilotica*). На оз. Сарыколь 5 июня добыта взрослая птица, вероятно, из числа гнездившихся здесь среди других крачек.

Малая крачка (*Sterna albifrons*). На степном озере в 25 км севернее Талды-Кургана 31 мая встречена гнездовая пара.

Чернобрюхий рябок (*Pterocles orientalis*). В пустынной степи у подножия Чулака в районе ущелья Кара-Чока 26 мая отмечена стайка до 10 особей, а на следующий день они прилетали на водопой к ручью (1.2.3.3.4 особи). В холмистой степи на пути от оз. Сарыколь к Капалу 5 июня видели группу их трех рябков.

Вяхирь (*Columba palumbus*). Встречен единственный раз 25 июня в старой карагачовой роще у пос. Капал.

Сизый голубь (*Columba livia*). Отмечался в ущелье Кара-Чока (27 мая), в скалах цирка в альпийском поясе северного склона хр. Мынчукур (11 июня). На р. Биен у Баян-Журека 13 июня добыт молодой, уже хорошо летавший.

Кольчатая горлица (*Streptopelia orientalis*). В Кугалах, Капале и других поселках во время поездки не встречена.

Обыкновенная горлица (*Streptopelia turtur*). Одиночная, видимо, случайно залетевшая самка с угнетенным яичником добыта 27 мая в ущелье Кара-Чока. В карагачовой роще у пос. Капал 6 и 25 июня наблюдались токующие самцы, а 29 июня на молодом карагаче в 1.5 м от земли обнаружено гнездо с 1 свежим яйцом. Гнездятся в тугаях Биена у Баян-Журека, где 15 июня на кустах облепихи в 30 м друг от друга осмотрено 2 гнезда, содержавшие по 2 яйца (в первом случае свежие, во втором – насиженные). Обычными горлинки были также в ущельях северного склона хр. Мынчукур близ Капала.

Большая горлица (*Streptopelia orientalis*). Неоднократно гнездовые пары отмечались в лесистых ущельях северного склона хр. Мынчукур (8-9 июня). Часто встречали их 21 июня по линиям электропередачи вдоль полей между Капалом и Талды-Курганом.

Обыкновенная кукушка (*Cuculus canorus*). Одиночки наблюдались в ущелье Кара-Чока (27 мая) и в ущелье Тюлькули на хр. Алтын-Эмель (29 мая). Особенно часто крики самцов слышали в ельниках ущелий северного склона хр. Мынчукур (7-10 июня) и в пойме р. Биен между горами Коктас и Баян-Журеком (13 июня).

Болотная сова (*Asio flammeus*). На торфяном болоте в 7 км северо-восточнее пос. Капал 29 июня выпугнули сову из зарослей ивняка.

Ястребиная сова (*Surnia ulula*). На северном склоне хр. Мынчукур вечером 6 июня слышали голос этой совы в ельнике с примесью берез, а 9 июня еще одну птицу видели здесь же в елово-пихтовом лесу.

Козодой (*Caprimulgus europaeus*). В ущелье Кара-Чок вечером 27 мая множество козодоев наблюдалось по склонам со скальниками. На хр. Алтын-Эмель отмечен в ущелье Тюлькули (29 мая).

Черный стриж (*Apus apus*). В большом числе наблюдался в скалах ущелья Тюлькули на хр. Алтын-Эмель (29 мая) и в долине Биена у Баян-Журека (13-15 июня). Кормящиеся стрижи встречались также в котловине оз. Сарыколь (4 июня).

Сизоворонка (*Coracias garrulus*). Гнездится в обрывах вдоль дороги Талды-Курган - Капал (начиная от р. Сарыбулак), а также в окрестностях ст. Уштобе.

Зимородок (*Alcedo atthis*). Наблюдался 21 июня на р. Сарыбулак, в 10 км северо-восточнее Талды-Кургана, где определенно гнездится. На речках Капальской долины не найден.

Золотистая щурка (*Merops apiaster*). В степи у подножия Чулака в районе Кара-Чока стайку наблюдали 27 мая. Небольшую колонию обнаружили 1 июня в обрывах в окрестностях ст. Уштобе.

Удод (*Upupa epops*). Наблюдался в кошарах в степи у подножия Чулака (в районе Кара-Чока) и у оз. Сарыколь, в поселках Кугалы и Каратальская МТС.

Бледная ласточка (*Riparia diluta*). Гнездится в обрывах на степном озерке в 25 км севернее Талды-Кургана (31 мая). Встречена также на оз. Сарыколь и у р. Сарыбулак (4 и 21 июня).

Скалистая ласточка (*Ptyonoprogne rupestris*). В ущелье р. Тюлькули на хр. Алтын-Эмель 29 мая на скале у воды найдено три жилых гнезда. На хр. Мынчукур близ Капала 7 июня небольшая стайка летала у перевала в Кору.

Деревенская ласточка (*Hirundo rustica*). Сравнительно обычна селах Кугалы, Капал, на Каратальской МТС, в кошарах ущелья Кара-Чока и в котловине оз. Сарыколь. В долине Биена у Баян-Журека (1800 м н. ур. м) гнездилась в глинобитных постройках жителей совхоза.

Городская ласточка (*Delichon urbica*). Часто наблюдалась в скалах ущелья Тюлькули на хр. Алтын-Эмель (29 мая). В долине Биена у Баян-Журека в нише обкатанного уступа гранитной скалы найдена колония из 5 пар, в которой в двух гнездах 15 июня содержалось 3 и 4 свежих яйца.

Малый жаворонок (*Calandrella brachydactyla*). Многочислен в полынно-злаковой степи в районе Кара-Чока (26-27 мая). Обычен в окрестностях Талды-Кургана, Уштобе и в котловине оз. Сарыколь по предгорному шлейфу с полынно-злаковой растительностью.

Степной жаворонок (*Melanocorypha calandra*). В массе встречался в полынно-злаковой степи у подножия Чулака и по степным увалам в районе ущелья Кара-Чока (26-27 мая). Гнездится в предгорной полынно-злаковой степи в окрестностях Талды-Кургана и Уштобе и в ковыльной степи у оз. Сарыколь. В злаковой степи Курымбель (1800-2000 м) между Капалом и Биеном отсутствовал.

Двупятнистый жаворонок (*Melanocorypha bimaculata*). Обитает в полынной степи в районе ущелья Кара-Чока, где 26 мая найдено гнездо с 5 сильно насиженными яйцами. В окрестностях ст. Уштобе многочислен по предгорному шлейфу со полынно-злаковой растительностью.

Полевой жаворонок (*Alauda arvensis*). Многочислен в злаковой степи и на полях у подножия Чулака и по степным увалам Кара-Чока, где 26 мая пойман слётком. Не менее

многочисленным был по полям вдоль дороги между пос. Кугалы и Царицынским перевалом (30 мая), в ковыльно-полынной степи и на полях у оз. Сарыколь (2-5 июня). В ковыльно-типчаковой степи Курымбель между Капалом и Биеном (1800-2000 м) этот жаворонок составлял основу населения птиц. На ковыльных увалах водораздела гор Коктас (2070 м) 15 июня найдено гнездо с 5 насиженными яйцами и добыта самка, которая, судя по развитому яичнику, еще откладывала яйца. По дороге на джайляу в горах у Капала 27 июня поймано 2 слётка.

Степной конёк (*Anthus richardi*). В Капальской долине был малочислен у слияния Биеней, где 14 июня добыт 1 экз. Наблюдался также 29 июня на болотах в 7 км северо-восточнее пос. Капал.

Полевой конек (*Anthus campestris*). Часто встречался в степи у подножия Чулака и в ущелье Кара-Чока (26-27 мая), вдоль дороги между Сарыколем и Капалом, в степи Курымбель между Капалом и Биеном. Вдоль Биена обычен по сухим гривам Коктаса, где 18 июня добыта самка от выводка с птенцами.

Лесной конек (*Anthus trivialis*). Обычен на северном склоне хр. Мынчукур близ Капала, где 7-11 июня в ельниках наблюдались поющие самцы.

Горный конек (*Anthus spinoletta*). Многочислен на хр. Алтын-Эмель на перевале из ущелья Тюлькули (29 мая). Фоновый вид на северном склоне хр. Мынчукур близ Капала, включая верхние курумники у перевала в Кору. Здесь 7 июня добыта самка, у которой в яйцеводе содержалось готовое яйцо еще без известковой оболочки.

Черноголовая трясогузка (*Motacilla feldegg*). Часто наблюдалась в пойме Каратала и на степных озерах в окрестностях Талды-Кургана, где обычна на гнездовании. Гнездится на заливных лугах у оз. Сарыколь. В Капальской долине наблюдалась у слияния Биеней и на болотах в 7 км северо-восточнее пос. Капал.

Желтоголовая трясогузка (*Motacilla citreola*). Обычна на гнездовании на степном озере в 25 км севернее Талды-Кургана, где 31 мая наблюдались самцы с кормом. В Капальской долине в большом числе гнездится у слияния Биеней и на болотах в 7 км северо-восточнее пос. Капал. Здесь 17 июня стенке берегового обрыва Биени в 30 см от уровня воды найдено гнездо с 4 птенцами-поршками и яйцом-«болтуном».

Горная трясогузка (*Motacilla cinerea*). На хр. Алтын-Эмель 28-29 мая часто наблюдалась брачными парами вдоль речного русла ущелья Тюлькули. В Капальской долине гнездовые пары часто встречались у слияния Биеней и в районе Баян-Журека (13-18 июня).

Маскированная трясогузка (*Motacilla personata*). Изредка наблюдалась на гнездовании на степном озере в 25 км севернее Талды-Кургана (1 июня) и у слияния Биеней (14 и 18 июня).

Туркестанский жулан (*Lanius phoenicuroides*). В ущелье Кара-Чока 27 мая отмечена брачная пара в кустарнике у скал. Многочисленны были жуланы 28-29 мая в ущелье р. Тюлькули (хр. Алтын-Эмель). Встречен также в окрестностях Уштобе, вдоль дороги между Талды-Курганом и Капалом, а также в каменистом ущелье у оз. Сарыколь. Сравнительно обычен в садах пос. Капал и в ущельях северного склона хр. Мынчукур, включая разреженные ельники с арчой и кустарниковые лога. Здесь же добыт гибридный экземпляр жулана (11 июня). В зарослях шиповника 8 июня осмотрено одно готовое гнездо без яиц и другое с кладкой из 6 яиц. В долине Биени у Баян-Журека в зарослях облепихи 13 июня осмотрено гнезда, содержавшие 1 и 5 яиц, а 15 июня – 5 яиц.

Чернолобый сорокопут (*Lanius minor*). Часто встречался в придорожных посадках карагача и лоха между Сарыколем и Капалом (5 июня), однако между Капалом и Биеном (1700-1800 м) уже отсутствовал.

Иволга (*Oriolus oriolus*). Пение одного самца отмечено в садах Каратальской МТС (2 июня), другого - в роще у пос. Капал (27-28 июня).

Скворец (*Sturnus vulgaris*). Часто встречался в селах вдоль дороги между Кугалы и Талды-Курганом. Сравнительно обычным был в пос. Капал, где 5-6 июня взрослые выкармливали птенцов в гнездах.

Розовый скворец (*Pastor roseus*). Небольшие стайки наблюдались в окрестностях Талды-Кургана (31 мая), у оз. Сарыколь (2 июня), в долине Биена у Баян-Журека (13 и 20 июня).

Сорока (*Pica pica*). На хр. Алтын-Эмель наблюдалась у входа в ущелье Тюлькули (29 мая). Гнездится в пойменном тугае Биена, отдельные пары отмечены в ивниках на болотах северо-восточнее пос. Капал. На северном склоне хр. Мынчукур близ Капала гнездится в ущельях с ельником и кустарниковых логах. Здесь в одной из скальных гряд в кусте жимолости, 8 июня осмотрено гнездо почти целиком лежащем на скале. Кладка содержала 7 яиц, эмбрионы в которых заполняли весь объём яйца.

Клушица (*Pyrhcorax pyrrhcorax*). Наблюдалась 29 мая в скалах ущелья Тюлькули (хр. Алтын-Эмель). Гнездится на северном склоне хр. Мынчукур близ Капала, где 7 и 8 июня в вершине одного из ущелий отмечено две пары и в одной из скал найдено недоступное для осмотра гнездо, в котором взрослые кормили птенцов. Здесь же в цирке в верховьях р. Музбулак 11 июня была замечена небольшая стая.

Альпийская галка (*Pyrhcorax graculus*). На северном склоне хр. Мынчукур в скалах Музбулака 11 июня добыта взрослая птица.

Галка (*Corvus monedula*). В большом числе наблюдалась 30 мая по дороге от пос. Кугалы на Царицынский перевал. В Капальской долине не встречена.

Грач (*Corvus frugilegus*). Встречался 30 мая по посевам между пос. Кугалы и Царицынским перевалом.

Черная ворона (*Corvus corone*). Изредка отмечалась в Капальской долине.

Обыкновенная оляпка (*Cinclus cinclus*). Часто встречалась парами по р. Тюлькули в хр. Алтын-Эмель, где 29 мая в нише в 1.5 м над водой найдено свежее гнездо без яиц. Обычной была на речке у пос. Капал, по речкам северного склона хр. Мынчукур, включая Музбулак. В ущелье р. Биен 15 июня найдено гнездо с еще не насиженными яйцами. Устроено оно было на валуне из мха и корешков, входное отверстие находилось сбоку. У слияния Биеней по руслу одной из каменистых речек обнаружено гнездо в стенке обрывистого берега в 75 см над водным потоком между свисающих камней. В нем 17 июня содержалось 3 вполне оперившихся птенца, разбежавшихся при осмотре.

Крапивник (*Troglodytes troglodytes*). На северном склоне хр. Мынчукур 7 июня наблюдали крапивника, залетавшего с кормом в расщелину гранитной скалы, где у него находилось гнездо, недоступное для осмотра. Другой отмечен 9 июня в буреломнике елово-пихтового леса. Интересна встреча поющего самца в альпийской зоне Мынчукура в Музбулаке, где он держался под скалой среди осыпи.

Гималайская завирушка (*Prunella himalayana*). На северном склоне хр. Мынчукур в Музбулаке в курумниках ниже цирков среди стелющейся арчи 11 июня встречено 2 поющих вполголоса самца, один из которых добыт в коллекцию.

Бледная завирушка (*Prunella fulvescens*). На северном склоне хр. Мынчукур в Музбулаке в кустиках стелющейся арчи выше границы леса 11 июня встречено две пары, одна из которых имела готовое гнездо без яиц, устроенное на высоте 75 см в периферийной части куста. Свито из растительных стеблей с выстилкой из мха.

Черногорлая завирушка (*Prunella atrogularis*). На северном склоне хр. Мынчукур близ Капала 9 июня поющих самцов слышали в ущелье среди захлавленного елово-пихтового леса. Там же, в Музбулаке, 11 июня добыт поющий самец в арче у верхней границы ельника.

Обыкновенный сверчок (*Locustella naevia*). В Капальской долине у слияния Биеней 17 июня на болотах с ивняком добыта самка с водянистым наседным пятном, явно слетевшая с гнезда.

Садовая камышевка (*Acrocephalus dumetorum*). Много поющих еще пролетных самцов наблюдали 27 мая в кустарниках ущелья Кара-Чока, а 2-3 июня – на Каратальской МТС и оз. Сарыколь.

Дроздовидная камышевка (*Acrocephalus arundinaceus*). Многочисленна на гнездовании в тростниках на побережье оз. Сарыколь (2-5 июня). На степном озере в 25 км севернее Талды-Кургана 31 мая в сухом тростнике найдено строящееся гнездо.

Ястребиная славка (*Sylvia nisoria*). Часто наблюдалась 29 мая в кустарниках по ущелью р. Тюлькули (хр. Алтын-Эмель), 2 июня в каменистом ущелье у оз. Сарыколь, 6 июня в роще у пос. Капал и 15 июня в ущелье р. Биен. В пойме р. Биен у Баян-Журека 13 июня в кусте барбариса в 50 см от земли обнаружено гнездо с кладкой из 5 свежих яиц.

Серая славка (*Sylvia communis*). В качестве обычной птицы наблюдали в кустарниковых зарослях ущелья р. Тюлькули в хр. Алтын-Эмель (28-29 мая), в окрестностях пос. Капал (5-6 июня) и в ущельях северного склона хр. Мынчукур (7-8 июня). В сухом отщелке гор Коктас по правобережью Биена 15 июня в кустике с тростником в 10 см от земли осмотрено гнездо с кладкой из 3 свежих яиц. У слияния Биеней, где отсутствовала *S. nisoria*, серая славка оказалась весьма обычной. Здесь 18 июня найдена кладка из 4 яиц.

Зеленая пеночка (*Phylloscopus trochiloides*). Многочисленный гнездящийся вид в елово-пихтовых лесах и тальниковых пойм речек в ущельях на северном склоне хр. Мынчукур.

Тусклая зарничка (*Phylloscopus humei*). На северном склоне хр. Мынчукур многочисленна в поясе елово-пихтового леса. В кустарниках ущелья Кара-Чока 27 мая часто встречались пролетные зарнички, из числа которых добыта исключительно жирная самка.

Индийская пеночка (*Phylloscopus griseolus*). На северном склоне хр. Мынчукур близ Капала в кустах шиповника и таволги на крутом склоне 8 июня встречена одиночка, явно из числа пролетных. В Музбулаке, в арчевнике выше границы леса, 11 июня отмечена пара, в которой самец активно пел на своем участке. Гнездится в сухих горах Коктас по Биену (2000 м н.ур. м), где 14 и 15 июня среди скал отмечен поющий самец и гнездовая пара.

Черноголовый чекан (*Saxicola torquata*). В ущелье р. Тюлькули в хр. Алтын-Эмель 29 мая встречен лишь один самец, явно пролетный. Встречался по ручьям в степи Курымбель, а также по болотам и лугам с тальниками в долине Биена и окрестностях пос. Капал (10-29 июня).

Обыкновенная каменка (*Oenanthe oenanthe*). В Алтын-Эмеле гнездовые пары отмечены 29 мая на перевале в ущелье Тюлькули. Изредка наблюдалась в степи Курымбель между Капалом и Биеном. Сравнительно чаще встречали её парами у входа в ущелье северного склона хр. Мынчукур и в альпийской зоне хребта в районе цирков Музбулака, где имеются норы сурков и сусликов.

Плешанка (*Oenanthe pleschanka*). В скалах ущелья Кара-Чока (26-27 мая) и в каменистом ущелье у оз. Сарыколь (2 июня) часто встречались поющие самцы и насиживающие кладки самки. Обычна в гранитных скалах долины Биена у Баян-Журека (2000 м), где 13 июня осмотрено гнездо с 4 пуховыми птенцами, а на следующий день найдено еще два гнезда, в одном из которых были пуховые птенцы, в другом слётки. В горах Коктас по Биену 15 июня в расщелине скалы осмотрено гнездо с 4 птенцами в пуху. В этот же день встречались слётки.

Плясунья (*Oenanthe isabellina*). Гнездится в степи Курымбель между Капалом и Биеном и в альпийской зоне хр. Мынчукур в Музбулаке.

Пестрый каменный дрозд (*Monticola saxatilis*). В Алтын-Эмеле 29 мая отмечена самка в ущелье Тюлькули. На северном склоне хр. Мынчукур одного самца встретили 11 июня в Музбулаке. В долине Биена между Коктасом и Баян-Журеком 14 июня наблюдали пару, волнующуюся около недоступного для осмотра гнезда в скалах. В горах Коктас 15 июня в трещине камня осмотрено гнездо с 5 птенцами в пеньках. Здесь же на следующий день найдено еще одно гнездо с птенцами.

Синий каменный дрозд (*Monticola solitarius*). В каменистом ущелье у оз. Сарыколь 2 июня отмечена гнездовая пара. В ущельях северного склона хр. Мынчукур и гор Коктас не найден.

Горихвостка-чернушка (*Phoenicurus ochruros*). В альпийской зоне хр. Мынчукур в заснеженном цирке Музбулака, обрамленного отвесными скалами, 11 июня в осыпи встречено 2 самца, один из которых добыт. В скалах сухих гор Коктас (2000 м) 14 и 15 июня встречено не менее трех гнездовых пар. В долине Биена у Баян-Журека 20 июня в трещине скалы найдено гнездо с оперившимися птенцами и яйцом-«болтуном».

Красноспинная горихвостка (*Phoenicurus erythronotus*). В ущельях на северном склоне хр. Мынчукур у Капала неоднократно отмечалась в ельниках с примесью рябины и выходами скал.

Южный соловей (*Luscinia megarhynchos*). Поющие самцы наблюдались в садах Талды-Кургана (1 июня) и в старой карагачовой роще у пос. Капал (5-28 июня).

Варакушка (*Luscinia svecica*). В Капальской долине на лугах с порослью тальников у слияния Биеней 17 и 18 июня добыто два поющих самца, имевших развитые семенники.

Деряба (*Turdus viscivorus*). В Алтын-Эмели 28- 29 мая встречался стайками в ущелье р. Тюлькули. В ущельях на северном склоне хр. Мынчукур 8-11 июня часто наблюдались поющие самцы в ельниках.

Московка (*Parus ater*). На северном склоне хр. Мынчукур 9-10 мая встречались парами в ельниках и елово-пихтовых насаждениях. У добытой самки было развито наседное пятно. Одиночку встретили 6 июня в роще у пос. Капал.

Князёк (*Parus cyaneus*). Часто встречалась с 6 по 28 июня в роще у пос. Капал, где гнездится.

Большая синица (*Parus major*). Гнездится в старой карагачовой роще у пос. Капал, где 27 июня добыты взрослая и молодая птицы.

Большой скалистый поползень (*Sitta tephronota*). На всем маршруте отмечен лишь в ущелье Кара-Чока (27 мая). В скалах ущелий Тюлькули (Алтын-Эмель), Мынчукура и Коктаса не обнаружен.

Краснокрылый стенолаз (*Tichodroma muraria*). В альпийской зоне хр. Мынчукур в цирке Музбулка 11 июня наблюдали поющего самца. Стенолаз сидел на горизонтальной поверхности вершины скалы, громко и очень мелодично пел, издавая короткие строфы. Песня начиналась с короткого звука «чивр», который переходил в протяжный свист флейтового тембра. Иногда стенолаз перелетал на другие выступы скал, где продолжал свое пение. Завершив пение он залетел в трещину, где у него, по всей видимости, находилось гнездо, недоступное для осмотра.

Домовый воробей (*Passer domesticus*). Обычный вид в поселках Кугалы и Капал. Первые слётки встречены здесь 25 июня.

Индийский воробей (*Passer indicus*). В ущелье Кара-Чок 27 мая много гнезд отмечено в постройках кошар, в одном из них было два яйца. В окрестностях ст. Уштобе гнезвился в норах обрывов совместно с сизоворонками и шурками. В древесных

насаждениях Каратальской МТС воробьи 2 июня только начали вить гнезда. В этот же день много воробьев наблюдали в каменистом ущелье у оз. Сарыколь.

Полевой воробей (*Passer montanus*). Обычен в поселках между Кугалы, Талды-Курганом. Уштобе и Капалом. Отмечено гнездование в глинобитных постройках совхоза в долине Биена у Баян-Журека.

Чиж (*Spinus spinus*). На северном склоне хр. Мынчукур близ Капала 9 июня в молодом елово-пихтовом лесу встречена взрослая птица.

Седоголовый щегол (*Carduelis caniceps*). В роще у пос. Капал 6 июня на дереве на высоте 7-8 м обнаружено гнездо с одним свежим яйцом; 27 июня самка насиживала 5 яиц.

Коноплянка (*Acanthis cannabica*). Часто встречалась мая в ущелье Кара-Чока, где 27 мая добыт слеток. Отмечена также в ущелье Тюлькули (Алтын-Эмель) и у оз. Сарыколь. Сравнительно обычна в Капальской долине в Коктасе и Курымбеле. Отмечено гнездование в древесных насаждениях в пос. Капал, где 30 июня на высоком карагаче наблюдалась самка, строившая гнездо.

Обыкновенная чечевица (*Carpodacus erythrinus*). В ущелье Кара-Чок 27 мая наблюдались пролетные стайки, состоящие из самок, а 29 мая много поющих самцов видели в ущелье Тюлькули в Алтын-Эмеле. Обычна на гнездовании по кустарникам и по елово-пихтовым насаждениям на северном склоне хр. Мынчукур, где 9 июня на небольшой елочке найдено готовое гнездо. У слияния Биеней 17 июня в ивовом кусте в 20 см от земли найдено завершённое гнездо без яиц, а на следующий в кустарнике осмотрено гнездо с кладкой из 5 свежих яиц. В карагачевой роще у пос. Капал 27 и 28 мая на карагачах в 3-4 м от земли осмотрено два гнезда с кладками из 4 свежих и 5 сильно насиженных яиц.

Тростниковая овсянка (*Emberiza schoeniclus*). Гнездится в тростниках у оз. Сарыколь.

Скалистая овсянка (*Emberiza buchanani*). Часто встречалась по склонам с выходами скал в ущелье Кара-Чока (26-27 мая), где является фоновым видом. В Капальской долине гнездится по Биену у Баян-Журека, где 13-14 июня отмечались пары на гнездовых участках и поющие самцы.

Желчная овсянка (*Emberiza bruniceps*). Обычна по холмистым предгорьям вдоль дороги между Талды-Курганом и Капалом, в окрестностях оз. Сарыколь. Отдельные поющие самцы наблюдались по сухим склонам степных увалов с кустарниками и скалками у пос. Капал.

М.Н. Корелов



